






AVALUACIÓ DE LES RACIONS A TRAVÉS DE LA CONSISTÈNCIA DEL FEMS

Nota	Aparença del fems	Fotos (Seguí)	Factors nutricionals més comuns
1	Consistència molt líquida, sense depressió ni anells, basses i reguerons de fems		<i>Excés de proteïna, excés de midó, poca fibra, excés de minerals</i>
2	Consistència tova no s'apila menys de 2.5 cm de profunditat		<i>Excés de proteïna, excés de midó, poca fibra, excés de minerals.</i> <i>Pastura d'herba molt jove</i>
3	Consistència de farinetes, s'enganxa a les botes, depressió central, anells concèntrics 4 cm de profunditat		<i>Racions equilibrades en energia, proteïna i suficients en fibra farratgera</i>
4	Pasta densa, no s'enganxa a les botes, sense depressió ni anells, més de 4 cm de profunditat		<i>Poca proteïna degradable, nivell baix de midó, excés de fibra, característic de vaques seques i de vedelles</i>
5	Massa fecal ferma seca i pastosa, entre 5 i 10 cm de profunditat		<i>Poca proteïna degradable, nivell baix de midó, excés de fibra, característic de vaques seques i de vedelles, falta d'aigua</i>

(font: Universitat Michigan)